

Casaca-de-couro-da-lama

Furnarius figulus

Fotografia: Irmãos Mello (2022)

Sobre a espécie

Pode ser confundido com o João-de-Barro, não só pela aparência e tamanho, mas também pelo canto em dueto, que é parecido. No entanto, se olharmos com atenção, veremos que o Casaca-de-couro tem uma coloração marrom bem mais viva na parte de cima da cabeça, costas, asas e cauda, além de uma faixa mais clara por cima do olho. A espécie adora “passear” por locais com lama e também próximo da água à procura de pequenos insetos. Pode ser visto com certa facilidade no manguezal em torno do Parque Tecnológico e nos gramados próximos. O ninho é semelhante ao do João-de-Barro.

Dados científicos

Nome Científico: *Furnarius figulus*

Nome em Inglês: Wing-banded Hornero

Reino: Animalia

Filo: Chordata

Classe: Aves

Ordem: Passeriformes

Família: Furnariidae



Fotografia: Irmãos Mello (2022)

Área de ocorrência

A espécie ocorre apenas no Brasil, com populações concentradas no leste do país, parte do Mato Grosso, Tocantins e Goiás. Também está presente ao longo do Rio Amazonas e alguns de seus afluentes. No Projeto, foi registrado na Ilha do Bom Jesus e no Parque Tecnológico da UFRJ.



Fonte: Google Maps (2023)

Instituições participantes do projeto

Realização



Universidade Federal do Rio de Janeiro

Patrocinadores

Apoio